

**NÍVEIS REDUZIDOS DE INSULINA EM PACIENTES COM DOENÇA DE CHAGAS AGUDA DA AMAZÔNIA
BRASILEIRA**

Tabela: 1 Medidas laboratoriais pré e pós-tratamento.

	Pré (n=13)	Pós (n=13)	Wilcox p valor
Adiponectina (ng/ml)	6,9 [6,9; 6,9]	6,9 [6,8; 6,9]	0,646
Leptina (ng/ml)	5,4 [4,0; 5,7]	5,6 [5,5; 5,7]	0,293
Insulina (μU/ml)	3,1 [1,1; 4,1]	0,8 [0,7; 1,4]	0,034

Valores expressos em mediana (intervalo interquartil)

Tabela:2 Medidas laboratoriais de comparação pré-tratamento e grupo controle

	DCA pré (n=13)	Grupo controle (n=15)	P-Value
Adiponectina (ng/ml)	6,9 [6,9; 6,9]	6,8 [6,8; 6,8]	0,068
Leptina (ng/ml)	5,4 [4,0; 5,7]	5,6 [5,4; 5,6]	0,422
Insulina (μU/ml)	3,1 [1,1; 4,1]	4,1 [3,2; 4,9]	0,089

Valores expressos em mediana (intervalo interquartil)

Tabela:3 Medidas laboratoriais de comparação pós-tratamento e grupo controle

	DCA Pós (n=13)	Grupo Controle (n=15)	P-Value
Adiponectina (ng/ml)	6,9 [6,8; 6,9]	6,8 [6,8; 6,8]	0,054
Leptina (ng/ml)	5,6 [5,5; 5,7]	5,6 [5,4; 5,6]	0,388
Insulina (μU/ml)	0,8 [0,7; 1,4]	4,1 [3,2; 4,9]	< 0,001

Valores expressos em mediana (intervalo interquartil)